

Waterloo

| Masse corporelle* | Aspect visuel de la peau | Sexe et âge |
|---|--|--|
| 0 moyenne 1 Au-dessus de la moyenne 2 Obèse 3 En-dessous de la moyenne | 0 Saine 1 Fine / grêle 1 Sèche / Déshydratée 1 Oedemateuse 2 Décolorée 3 Irritation cutanée | 1 Masculin 2 Féminin 1 14 à 59 2 50 à 64 3 65 à 74 4 75 à 80 5 81 et + |
| Incontinence | Mobilité | Appétit |
| 0 Totale / Sonde 1 Occasionnellement 2 Incontinence fécale, sonde 3 Incontinence double | 0 Complète 1 Agité 2 Apathique 3 Restreinte 4 Immobile / Traction 5 Patient mis au fauteuil | 0 Moyen 1 Faible 2 Alimentation par sonde gastrique uniquement 3 A jeun, anorexique |
| Malnutrition des tissus | Déficiences neurologiques | Médicament |
| 8 Cachexie terminale 5 Déficience cardiaque 5 Insuffisance vasculaire périphérique 2 Anémie 1 Tabagisme | 4-6 Diabète, Sclérose en plaque, AVC, Déficit sensoriel, Paraplégies | 4 Cytotoxiques, Corticoïdes à haute dose, Anti-inflammatoire |
| | | Chirurgie / Traumatisme |
| | | 5 Orthopédie, Partie inférieure, Colonne 5 Intervention de + de 2 heures |

> 10 : risque > 15 : haut risque > 20 : très haut risque

*Poids par rapport à la taille